KRANKENHAUS · BAUCH

Appendizitis (ICD-10-GM K35) – kurz

FACHLICH GEPRÜFT 18.11.2026

> MERKE
> Bei Verdacht auf Appendizitis keine Wärme, keine Abführmittel – sie können eine Perforation begünstigen.

Entzündung des Wurmfortsatzes am Blinddarm, häufigster Grund für eine Bauch-Notoperation bei Kindern und jungen Erwachsenen.

Leitsymptome

- Schmerz zuerst um den Nabel, dann im rechten Unterbauch; Appetitlosigkeit, Übelkeit, leichtes Fieber; Loslassschmerz, Schmerz beim Hüpfen; bei Kindern, Schwangeren und alten Menschen oft untypisch.

Pflege: Beobachtung

- Schmerzverlauf, Temperatur, Puls, Bauch (Abwehrspannung); nach OP Wunde, Kostaufbau, Darmtätigkeit.

Komplikationen und Warnzeichen

- Perforation mit Peritonitis (plötzliche Schmerzbesserung, dann brettharter Bauch, Fieber, Schock), Abszess -> sofort Ärztin/Arzt.

GANZER BEITRAG · ERKLÄRUNGEN · QUELLEN

stationsfuchs.de/krankheitsbilder/appendizitis

Kostenlos lernen ohne Anmeldung: Quiz, Laborwerte, Pflegeplanung und mehr auf stationsfuchs.de

Lernhilfe für die Ausbildung. Ersetzt keine Leitlinie, keinen Standard und keine ärztliche Anordnung.
Darf frei kopiert, gedruckt und weitergegeben werden. Nicht verändern, nicht verkaufen. © Meshor GmbH