KRANKENHAUS · BAUCH

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen: Morbus Crohn und Colitis ulcerosa

FACHLICH GEPRÜFT 18.11.2026

> MERKE
> Crohn kann überall von Mund bis After und springt; Colitis beginnt im Rektum und bleibt im Dickdarm.

Chronische, in Schüben verlaufende Entzündungen des Darms. Morbus Crohn: diskontinuierlich, kann den gesamten Magen-Darm-Trakt befallen, alle Wandschichten. Colitis ulcerosa: nur Dickdarm, beginnt im Rektum und breitet sich kontinuierlich aus; Einteilung Proktitis, Linksseitencolitis, ausgedehnte Colitis.

Leitsymptome

- Morbus Crohn: Durchfall, Bauchschmerzen (oft rechter Unterbauch), Gewichtsverlust, Fieber, Fisteln (v. a. perianal), Abszesse, Stenosen.
- Colitis ulcerosa: blutig-schleimige Durchfälle, schmerzhafter Stuhldrang (Tenesmen).
- Beide: Mangelzustände (Vitamin B12, Eisen, Vitamin D), Beteiligung von Gelenken, Haut, Augen.

Pflege: Beobachtung

- Stuhlfrequenz, Konsistenz, Blut/Schleim, Schmerz, Temperatur, Gewicht, Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt, Haut perianal (Fisteln, Wundsein), Infektzeichen unter Immunsuppression.

Komplikationen und Warnzeichen

- Toxisches Megakolon (geblähter, schmerzhafter Bauch, Fieber, Tachykardie, Schock), Perforation, massive Blutung, Ileus, Abszess -> sofort Ärztin/Arzt; Darmkrebs.

GANZER BEITRAG · ERKLÄRUNGEN · QUELLEN
stationsfuchs.de/krankheitsbilder/chronisch-entzuendliche-darmerkrankungen
Kostenlos lernen ohne Anmeldung: Quiz, Laborwerte, Pflegeplanung und mehr auf stationsfuchs.de

Lernhilfe für die Ausbildung. Ersetzt keine Leitlinie, keinen Standard und keine ärztliche Anordnung.
Darf frei kopiert, gedruckt und weitergegeben werden. Nicht verändern, nicht verkaufen. © Meshor GmbH