AMBULANTE PFLEGE · PALLIATIVVERSORGUNG ZU HAUSE

Tumorschmerz zu Hause – Grundsätze

FACHLICH GEPRÜFT 18.11.2026

> MERKE
> Tumorschmerz wird nach der Uhr behandelt, nicht erst wenn er kommt – und wer Opioide bekommt, bekommt auch ein Abführmittel.

Schmerzen durch die Krebserkrankung selbst (z. B. Knochenmetastasen, Nervenkompression) oder ihre Behandlung. Sie sind meist dauerhaft vorhanden und haben oft zusätzlich Spitzen (Schmerzexazerbationen, Durchbruchschmerz) und.

Leitsymptome

- Dauerschmerz, bewegungsabhängiger Schmerz, Schmerzexazerbationen; neuropathische Anteile (brennend, einschießend) und.

Pflege: Beobachtung

- Schmerzintensität regelmäßig und nach Bedarfsgabe (Wirkung dokumentieren), Stuhlgang (Obstipation), Übelkeit, Müdigkeit/Sedierung, Verwirrtheit, Halluzinationen, Atmung (Nebenwirkungen: Obstipation, Sedierung, neurotoxische Effekte) und.

Komplikationen und Warnzeichen

- Plötzlich neuer, starker Schmerz; Rückenschmerz mit Beinschwäche oder Blasenstörung (drohende Querschnittlähmung durch Metastasen) -> **sofort ärztlich bzw. 112 (drohende Querschnittlähmung als hochkomplexe Situation) und. Starke Schläfrigkeit, langsame Atmung, Delir unter Opioiden -> sofort ärztlich** und.

GANZER BEITRAG · ERKLÄRUNGEN · QUELLEN

stationsfuchs.de/krankheitsbilder/tumorschmerz-zu-hause

Kostenlos lernen ohne Anmeldung: Quiz, Laborwerte, Pflegeplanung und mehr auf stationsfuchs.de

Lernhilfe für die Ausbildung. Ersetzt keine Leitlinie, keinen Standard und keine ärztliche Anordnung.
Darf frei kopiert, gedruckt und weitergegeben werden. Nicht verändern, nicht verkaufen. © Meshor GmbH